



З метою моніторингу за особливо небезпечними та природно-вогнищевими інфекціями протягом 2017 року групою спостереження здійснено 13 виїздів, під час яких обстежено прилеглі території поблизу м. Черкаси та 49 - ти населених пунктів 16 адміністративних районів області (Черкаський, Чорнобаївський, Канівський, Золотоніський, Маньківський, Чигиринський, Кам'янський, Звенигородський, Лисянський, Тальнівський, Корсунь-Шевченківський, Городищенський, Шполянський, Уманський, Жашківський, Смілянський райони).

Зібрано 750 пелеток хижих птахів, при дослідженні яких на туляремію виявлено 49 (6,5%) позитивних результатів в титрах 1:10 – 1:80 в мм. Черкаси, Сміла, Золотоноша, смт. Маньківка, Катеринопіль, Чорнобай, Черкаському, Чигиринському, Золотоніському та Чорнобаївському районах, у 2016р. цей показник склав 3,3%.

Відловлено 843 екз. дрібних ссавців, при серологічному дослідженні крові яких 3,7% результатів були позитивними на туляремію в титрах 1:20-1:80 (Черкаський, Звенигородський, Золотоніський, Тальнівський, Корсунь-Шевченківський, Жашківський, Маньківський райони) (2016р. – 1,7%). На ієрсиніоз та псевдотуберкульоз позитивні результати в титрах 1:20 – 1:160 (Черкаський, Лисянський, Тальнівський, Корсунь-Шевченківський, Маньківський і Звенигородський райони), що складає 3,2% проти 2,6% у 2016 р. При бактеріологічному дослідженні матеріалу від гризунів виділено 12 культур І. ентероколітика (1,43%) в Черкаському та Канівському районах (2016р. – 1,3%).

Зібрано 1344 екз. кліщів. При дослідженні них на туляремію позитивних знахідок не було. На природну інфікованість бореліями досліджено 476 екз. кліщів, носійство борелій

виявлено у 77 екз., що становить 16,1% (2016р. - 7,3%). За результатами позитивних досліджень підтверджено ензоотичність територій на хворобу Лайма в мм. Черкаси, Канів, в Канівському (с. Ліпляве), Черкаському (с. Мошни, с. Леськи, с. Степанки, с. Свідівок), Драбівському (с. Безбородьки), Золотоніському (с. Чапаєвка), Маньківському (с. Іваньки, с. Чорна Кам'янка) районах.

Відібрано 55 проб води відкритих водоймищ на туляремію та 15 проб ґрунту на сибірку. Результати дослідження негативні.

З метою вивчення імунобіологічного фону проведено серологічний скринінг населення ензоотичних територій в Канівському та Черкаському районах. Досліджено 80 сироваток на туляремію, з яких 10 проб позитивні в титрах 1:20 – 1:40.

Досліджено на природну інфікованість бореліями 104 екз. кліщів знятих з людей, з них 8 (7,8%) з позитивним результатом (2016р. 4,7%).

Враховуючи результати досліджень, епідпрогноз залишається несприятливим, не виключені випадки інфікування людей збудниками туляремії та погіршення епідемічної ситуації з іксодових кліщових бореліозів.

З метою попередження епідускладнень з холери проводився моніторинг за циркуляцією збудника в об'єктах довкілля відповідно до наказу від 03.05.2017 № 144, яким затверджено стаціонарні точки у відкритих водоймах. Досліджено 341 проба води, збудник холери не виділений.